

İmal tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat tarihi ve numarası: 21.01.2022/12214

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Septorya yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	150 ml/da	42 gün
	Tahıl Küllemesi (<i>Erysiphe graminis</i> f. sp. <i>tritici</i>)	150 ml/da	42 gün
	Sarı Pas Hastalığı (<i>Puccinia striiformis</i>)	150 ml/da	42 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

İlaçlama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

CORTEVA™
agriscience

QUAKE® 112.5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	C4:21	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
------	-------	-------	-------------------------

62,5 g/L pyraclostrobin + 50 g/L fenpicoxamid

Önce etiketi okuyunuz

Evide kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürünü uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajının ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İnsan zehirlenme vakaları ve deneysel zehirlenme semptomları bilinmemektedir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürünü ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Bilinci kapalı kişiye ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz.

Yutulması halinde: Derhal zehirlenme kontrol merkezine veya doktora başvurun. Zehirlenme kontrol merkezi veya doktor söylemediği takdirde, hastayı kusturmaya çalışmayın. Kişisel sıvı vermeyin. Bilinci kaybolmuş bir kişiye ağızdan herhangi bir şey vermeyin.

Solunması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkarın; nefes almıyorsa, acil durum merkezini veya ambulansı aradıktan sonra suni solunum yaptırın. Suni solunum ağızdan ağıza yapılacaksa, uygulayıcı kurtarıcı kuruması (cep maskesi vb.) kullanılmalıdır. Tedavi önerileri için zehirlenme kontrol merkezine veya doktora başvurun. Solunumun güçleşmesi halinde, yetkili personel tarafından oksijen verilmesi gerekir.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ

™* Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.



Net Miktarı:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Fenpicoxamid (Inatreq active), Pyraclostrobin
ZARARLILIK İŞARETİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Sisi / Buharları / Spreyi solumaktan kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P302 + P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.

P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takili ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.

P501: İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Bu ürün balık ve sucul omurgasızlara toksiktir.

Uygulama yapılmış alanlara yakın sularda yaşayan sucul organizmalara bulaşması tehlikelidir.

Doğrudan suya ya da yüzey suyu olan yerlere uygulamayınız.

Boş ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.

Anılara zehirlidir,çiçeklenme zamanı kullanmayınız,

Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında üç (3) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

CORTEVA™
agriscience

CORTEVA TÜRKİYE TARIM A.Ş.
YÜREĞİR Y.D. / 310 000 0066

Net Sicil No: 85615

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KURUMSAL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21 Ocak 2022
KABUL EDİLMİŞTİR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Buğday:

Septoria yaprak lekesi (*Septoria tritici*): Genel olarak ilaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşık ve başaklanma döneminde yağışlı havalara devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir, bu durumda ilk ilaçlamadan 21 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

Tahlül külemesi (*Erysiphe graminis* f. sp. *tritici*): İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmelidir. Hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. Hastalık için elverişli hava şartlarının devam etmesi durumunda ilk ilaçlamadan 21 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

Sarı Pas Hastalığı (*Puccinia striiformis*): Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 oranlı nem ve 15-20°C sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa, kullanılan ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.

Bir sezonda aynı yerde buğdayda 2'den fazla uygulama yapmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

QUAKE® 112,5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C4:21 ve Grup C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle olası direnç gelişimini geciktirmek için **QUAKE® 112,5 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C4:21 ve Grup C3:11 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Fiziksel uyumu test edebilmek için, tank karışımında kullanılacak ilaçlardan bir miktar alarak su ile ön karışım yapın ve 20 dakika bekletin. Eğer karışım bozulmadan kalıyorsa ya da tekrar kolayca karışıyorsa fiziksel olarak uyumludur. Farklı özelliklerde değişik materyallerin karışımları ve yoğun karışımlar tavsiye edilmez. Etiketinde yer alan kullanım dozunu aşmayın. Etiketinde bu tür karışımlarla ilgili sınırlamaları olan ilaçlarla karışım yapmayınız.

Kısıtlamalar: Stres altındaki bitkilere uygulama yapmayınız.

Münavebe durumu: **QUAKE® 112,5 EC** uygulanan yerlerde münavebe bitkisi ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

CORTEVA™ agriscience QUAKE® 112.5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	C4:21	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
------	-------	-------	-------------------------

62,5 g/L pyraclostrobin + 50 g/L fenpicoxamid

Cilt ile temas halinde: Bulaşık giysileri üzerinden çıkarın. Cildi 15-20 dakika süreyle bol suyla yıkayın. Tedavi önerisi için zehirlenme kontrol merkezine veya doktora başvurun. Uygun acil durum güvenlik duşu tesisi çalışma alanında bulunmalıdır.

Göz ile temas halinde: Derhal gözleri sürekli olarak akan suyla en az 30 dakika boyunca yıkayın. İlk 5 dakikadan sonra kontakt lensleri çıkarın ve gözleri yıkamayın sürdürün. Tercihen bir göz doktorundan olmak üzere, acil tıbbi yardım isteyin. Uygun acil durum göz yıkama çeşmesi yakınlarında bulunmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)*NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ

*TM® Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

FİRMA BEYANI :

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dâhilinde kullanılmasını halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

ÜRETİCİ FİRMA

Corteva Agriscience International Sarl.
Route de Suisse 160 CH-1290
Versoix, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ

DuPont de Nemours (France) SAS
82, Rue de Wittelsheim, BP 90149, 68701
Cernay, Cedex, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Corteva Turkey Tarım A.Ş.
Taşçı Mahallesi, Karataş Bulvarı No: 910,
01375, Yüreğir, ADANA
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27

Acil Durum için: +90 538 973 22 00

CORTEVA™
agriscience

CORTEVA TURKEY TARIM A.Ş.
YÜREĞİR V.D. - 310 000 0066
Tic. Sicil No: 85615

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

Bİ. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Baire Başkanı



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIBUL EDİLMİŞTİR.
21 Ocak 2022

MZB