

İmal Tarihi:  
Suo Kullanma Tarihi:

Sarj Numarası:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 12.05.2005 - 5100

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama İle Hasat Arası Süre
Zeytin	Zeytin Sineği ( <i>Bactrocera olea</i> )	<b>Uçak Uygulaması</b> 800 ml ilaç + 800 ml su/ha (Ergin) <b>Kısmi Dal Uygulaması</b> 1 lt. + 10 lt.su (Ergin)	7 gün
İncir	Ekşilik böcekleri ( <i>Carpophilus hemipterus</i> , <i>C. obsoletus</i> , <i>C. mutillus</i> )	<b>16 Besi tuzağı / ha</b> (1 Besi Tuzağı = 50 ml ilaç + 500 ml Su)	-
Turunçgil*	Akdeniz Meyve Sineği ( <i>Ceratitidis capitata</i> )	<b>Kısmi dal uygulaması</b> 1 lt. ilaç + 10 lt.su (Ergin)	3 gün
Kiraz	Kiraz Sineği ( <i>Rhagoletis cerasi</i> )	1,2 lt. ilaç + 10 lt.su (Ergin)	3 gün

\*Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan SUCCESS® 0.24CB önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH'sı 7 civarında olan temiz su kullanılması gereklidir. Uygulama sırasında hazırlanan karışımın devamlı karıştırılması gereklidir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

#### KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Devamı Sayfa 2'de



## SUCCESS® 0.24CB

Konsantr Yem (CB)

GRUBU	5	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	---	-----------------------------

0.24 g/l spinosad

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/3'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

**BESİ TUZAKLARI ÜZERİNDE MUTLAKA, "İLAÇLIDIR-İÇİLMEZ" YAZAN İBARE OLMALIDIR!**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM BİLGİLERİ

Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçebilmek için **Önem İfadelerini (P280)** dikkate alınız.

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Maruz kalının bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.**

**Yutulması halinde:** Kusturmayın. Kusturma kararı hekim tarafından alınmalıdır.

**Gözler ile temas etmesi halinde:** Su ile birkaç dakika süreyle iyice durulayınız. Kontak lensler mevcutsa 1-2 dakika sonra çıkarınız ve bir süre daha gözleri yıkamaya devam ediniz. Bir göz doktoruna danışınız.

**Deri ile temas etmesi halinde:** Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak yıkayınız. Kirilenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirilenen giysilerinizi yıkayınız.

**Soluması halinde:** Hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırın, temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

© Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Spinosad.

#### ÖNLEM İFADELERİ

**P280:** Koriyucu eldiven/koriyucu kıyafet/göz koriyucu/yüz koriyucu kullanın.

**P501:** İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin

**EUH208:** 1,2-benzizotiazolin-3-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Toprak kökenli aktinomiset bakterisi *Saccharopolyspora spinosa*'dan doğal yollarla (fermantasyon-mayalanma yoluyla) elde edilmiş bir Naturalye insektisittir.
- Mide ve temas yolu ile hedef zararlının sinir sistemine etki eder ve hedef organizmanın beslenmesini hemen durdurur. Buna bağlı olarak en geç 3 gün içinde ölüm gerçekleşir.
- Hazırlanan karışımın direk güneş ışığından korunması gerekir.
- Arıların aktif olarak polen topladığı dönemde ve kovanlar yakınında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama için arıların aktif olmadığı sabah erken veya akşam geç saatleri tercih edin. Uygulamalar sırasında kovanları kapatın ve bitki koruma ürünü bitkiler üzerinde tamamen kuruyana kadar kapalı tutun.
- Sulama ve içme suyu kaynaklarına buluşturmayınız.
- Boş kapları başka maksatlar için kullanmayınız. Boşalan ambalajları yasalara öngörülen tavsiyelere uygun olarak imha ediniz. (bkz. "Önem İfadeleri: P501")

#### DEPOLAMA DURUMU

- Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında **iki (2) yıl** süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılmasını halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.



CORTEVA TÜRKİYE TARIM A.Ş.  
NADİLLİ KURUMLAR V.D. - 310 000 00 66  
Tic. Sicil No: 182593

**Hüseyin BÜYÜK**  
Ruhsatlandırma Lideri

26 Temmuz 2021  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



Sayfa 1'in devamı

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

### ZEYTİN – Uçak Uygulaması

- Mücadele zamanı erken uyarıya göre belirlenir (Ergin uçuşu ve vuruklar takip edilir) ve ihtiyaca göre tekrarlanır.
- İlaçlama ULV şeklinde uçakla yapılır. Bir sıra ilacli bir sıra boş şekilde serit uygulaması yapılır.
- Önceden hazırlanacak olan karışımı 1/1 oranında su ile karıştırılmalı ve uçak tankına aktarılmalıdır.
- En iyi etki büyük damla çapından alınıp, damla çapını mümkün olduğu kadar büyümek için düşük basınçla uygulanmalıdır.

### ZEYTİN – Yerden Uygulama

- McPhail tuzakları ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklarda ergin popülasyonu izlenir. Tuzaklarda yakalanan ergin sayısının artmaya başladığı temmuz-ağustos aylarında yapılan vuruk kontrollerinde; salamuralık çeşitlerde % 1, yağlıkeçesitlerde ise % 6-8 vuruk saptandığında, zehirli yem kısmı dal şeklinde uygulama yapılmalıdır.

### ZEYTİN – Zehirli Yem Kısmi Dal Uygulamasında

- Zeytin yok yılında yağlık çeşitlerde % 6-8 eşik aşığıya çekilebilir. İlaç+çezbedici karışımı, ilaçlama sıra atlamadan, ağaçların güneydoğu yönündeki 1,5-2 m<sup>2</sup>'lik kısmına 120-130 ml zehirli yem karışımı düşecek şekilde uygulanmalıdır.
- Uygulamaya hasada 20 gün kalana kadar devam edilir.

### İNCİR – Hazır Yem Uygulaması

- Besi tuzakları, Haziran ayı başında (ileklemeden önce) bahçelere asılır.
- Ağız genişliği 20-30 cm (1-2 lt hacimli) olan plastik veya PET bir kaba 50 ml ilaç+500 ml su konur. Bir çubuk yardımı ile iyice karışması sağlanır.
- İhtiyaç duyulan besi tuzakları sayısı önceden hesaplanır, daha sonra 10 lt'lik su alabilen kaba 1 lt ilaç konur ve iyice karıştırılır. Her besi tuzakına 550 ml karışım gelecek şekilde paylaştırılır.
- 625m<sup>2</sup> alanın ortasına 1 adet besi tuzakı, yerden 1,5 - 2.0 m yükseklikteki ağaçların güneydoğu bölümündeki dallarına bağlanarak asılır.
- Besi tuzakları haftada bir boşaltılarak yeniden hazırlanır; hasat sonuna kadar işlem tekrarlanır.
- Besi tuzakları su ile temizlenir, kullanılan su ve 8li böcekler açılacak bir çukur içine boşaltılır (20 cm x 20 cm veya ihtiyaca göre daha büyük), işlem bitince çukur toprakla kapatılır.
- Hasattan sonra kaplar su ile temizlenerek bir sonraki yıl kullanılmak üzere saklanabilir.

### TURUNCGİL – Zehirli Yem Kısmi Dal Uygulaması

- Tuzaklarda ergin yakalanıp meyvelerde renk değişimi başladığında ilk uygulama yapılır. Günlük ortalama sıcaklıklar 16°C'nin altına düşüncüye kadar ilacın etki süresine bağlı olarak uygulamalar tekrarlanır.
- Bir sıra ilaçlanır bir sıra boş olarak atlanır. İkinci uygulamada, atlanan sıra ilaçlanır. Uygulamalar, sıralar dönüşümlü olarak ilaçlı-ilaçsız olacak şekilde tekrarlanır.
- Hazırlanan karışım, turuncgöl ağaçlarının güney bölümündeki 1-2 m<sup>2</sup> alan, yaprak ve dallar ıslanacak şekilde ve ağaç başına 120-130 ml ilaçlı su gelecek şekilde uygulanmalıdır.
- İlaçlama iri zercikler halinde olmalıdır, dolayısıyla düşük basınçlı pülverizatörle uygulama yapılmalıdır.

### KİRAZ – Zehirli Yem Kısmi Dal Uygulaması

- Bahçelere cezbedici ile göresel sarı yapışkan tuzaklar (2-3 adet/da) asılarak ilk ergin uçuşu belirlenir. Tuzaklar ağacın güneydoğu yönüne yerden 1,5-2 m yükseklikteki meyveli bir dalına asılmalıdır.
- İlaçlama ilk ergin görüldükten sonra 1 hafta içinde yapılmalıdır. Gerekirse ilacın etki süresi, ergin uçuşunun devam etmesi ve son uygulama ile hasat arasındaki süre dikkate alınarak bir uygulama daha yapılabilir.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SUCCESS® 0.24 CB adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup 5 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonu içerisinde SUCCESS® 0.24 CB'nin önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğinde farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 5 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞILIRLIK DURUMU

Herhangi bir bitki koruma ürünü, gübre veya kimyasal ile karıştırılarak uygulanmaz.



# SUCCESS® 0.24CB

Konsantre Yem (CB)

GRUBU	5	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	---	-----------------------------

0.24 g/l spinosad

### ÜRETİCİ FİRMA:

Corteva Agriscience International Sàrl  
Route de Suisse 160, CH-1290,  
Versoix, İsviçre

### ÜRETİM TESİSİ:

DuPont De Nemours ( France) S.A.S.  
82, Rue De Wittelsheim BP 90149  
68701 Cernay Cedex, Fransa

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Corteva Turkey Tarım A.Ş.  
Taşçı Mahallesi, Karataş Bulvarı No:910  
Yüreğir /Adana ,Türkiye  
Tel: +90 322 355 68 00  
Faks: +90 322 503 33 27

Acil durum için: + 90 538 973 22 00



Hüseyin BÜYÜK  
Ruhsatlandırma Lideri

26 Temmuz 2021  
TARIM VE ÖRMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.